XXX Encontro Anual de Iniciação Científica
VII Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior
eaic 2021

CONDUTAS RELACIONADAS Á REMOÇÃO DE TERCEIROS MOLARES INFERIORES ENTRE ESPECIALISTAS EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR.

Manoela Wisniewski Bevervanso (CNPq), Luciana Dorochenko Martins (Orientador), e-mail: dorochenkoluciana@gmail.com.

Universidade Estadual de Ponta Grossa/Departamento de Odontologia.

Odontologia, Cirurgia Buco-Maxilo-Facial.

Palavras-Chave: *Terceiro Molar, Cirurgia Bucal, Tomada de Decisões*

Resumo

A remoção cirúrgica de terceiros molares é um dos procedimentos mais comuns em cirurgia bucal. A importância de garantir a qualidade do tratamento é bem compreendida pelos cirurgiões dentistas. Em contraste, existe pouca preocupação em relação aos fatores que influenciam a decisão de extrair terceiros molares inclusos, bem como a conduta mais correta para o tratamento. Para melhorar esses processos, é necessário estudar como os dentistas pensam e respondem a diferentes tomadas de decisão sobre essa cirurgia, e vincular os resultados com a formação profissional.

Introdução

Terceiros molares inferiores inclusos e parcialmente irrompidos têm sido associados à vários fatores para sua remoção (Zadik & Levin 2007). A importância da qualidade da saúde bucal vem aumentando, e é um assunto que exige maior atenção e conscientização tanto dos indivíduos quanto dos cirurgiões dentistas. (Alves-Pereira D. et al, 2017).

Material e Métodos

Essa pesquisa é um estudo observacional transversal onde foi aplicado um questionário com questões relacionadas à conduta pré-operatória, transoperatória e pós-operatória na remoção de terceiros molares. O grupo de estudo foram os especialistas em cirurgia e traumatologia buco maxilo facial da cidade de Ponta Grossa-PR (n=15).

Resultados e Discussão

- ✓ 12 Especialistas em CTBMF;
- ✓ 100% dos entrevistados usualmente realizam cirurgia para remoção de terceiros molares inclusos;
- ✓ 66,7% dos profissionais consideram a posição distoangular mais difícil de realizar a cirurgia, seguido da posição horizontal e vertical;
- ✓ O exame de imagem mais utilizado pelos profissionais é a panorâmica seguida de tomografia.
- ✓ 100% dos profissionais entrevistados recomendariam a extração do dente quando há sintomatologia dolorosa;
- ✓ 97,2% dos profissionais recomendam a exodontia em quadros de pericoronarite;
- ✓ 58,3% dos profissionais recomendariam a exodontia de um terceiro molar assintomático.




Gráfico 1. Principais razões para recomendar a remoção de terceiros molares.




Gráfico 2. Principais razões para não recomendar a remoção de terceiros molares.

Conclusão

Os entrevistados apresentaram opiniões e condutas semelhantes para cada caso, enxergando o paciente como um todo e levando em consideração as características apresentadas. Pode-se concluir que os profissionais especialistas se mostraram mais confiantes para realizar o procedimento de exodontia quando comparados com os clínicos gerais e acadêmicos.

Agradecimentos

Profª Luciana Dorochenko, UEPG, CNPq e Departamento de Odontologia.

ZADIK, Yebua, LEVIN, Liran. Decision making of Israeli, East European, and South American dental school graduates in third molar surgery: is there a difference? J. of Oral and Maxillof. Surg., Israel, v. 65, n. 4, p. 658-662, April, 2007. Disponível em: https://scihub.wikicn.top/10.1016/j.joms.2006.09.002. Acesso em: 3 set. 2020.

ALVES-PEREIRA, Et Al. Clinician-related factors behind the decision to extract an asymptomatic lower third molar. A cross-sectional study based on Spanish and Portuguese dentists. Medicina Oral, Patologia Oral y Cirurgia Bucal, Portugal, Volume 22, Issue 5, p. (609-615), September, 2017. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28809364/. Acesso em 3 set. 2020.

UEPG Universidade Estadual de Ponta Grossa
ISSN 1676-0093
propesp PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO