FLORA DOS CAMPOS GERAIS DO PARANÁ: THEACEAE Mirb. ex Ker Gawl

Vitória Barbosa Miranda (PIBIC-EM-CNPq/UEPG), Marta Regina Barrotto do Carmo (Orientadora), e-mail: mrcarmo@uepg.br

Universidade Estadual de Ponta Grossa/ Colégio Cívico-Militar Frei Doroteu de Pádua

Ciências Biológicas, Botânica

Palavras-chave: taxonomia, árvores paranaenses, *Laplacea fruticosa*, florística, floresta ombrófila mista

Resumo:
A Família Theacea é uma angiosperma do clado das Eudicotiledôneas, ordem Ericales com distribuição predominantemente tropical. Apresenta o hábito arbório e arbustivo e são encontrados nove gêneros e cerca de 460 espécies em todo mundo. Para o Brasil, tem sido apontado a ocorrência de uma única espécie nativa, pela sinonimização de cinco outras espécies. Assim, o objetivo do trabalho foi levantar a espécies de Theaceae ocorrentes nos Campos Gerais do Paraná (Brasil), para contribuir na caracterização e distribuição dos representantes na região, já que estudos relatam a enorme variação ao longo do país. Para o levantamento da família Theaceae nos Campos Gerais foram realizadas consultas e análises das exsicatas do herbário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HUPG), somadas à buscas no banco de dados *speciesLink* (disponível em: https://specieslink.net/search/) com registros de coletas dos municípios da referida região. Um total de 167 espécimes foram encontrados distribuídas em 38 herbários. Os municípios dos Campos Gerais com o maior número de coletas de Theaceae foram Ventania (36 coletas), Tibagi (25), Ponta Grossa (18), Jaguariaíva (15) e Balsa Nova (13). Foram encontradas três espécies, sendo uma nativa e duas cultivadas. A espécie nativa, *Laplacea fruticosa* (Schrad.) Kobuski, conhecida com o nome popular de pau-de-Santa-Rita., apresenta forma de vida predominantemente arbórea, alcançando até 10 m de altura. As folhas são alternas espiraladas, com formato elíptica, oboval a oblanceolada; lâmina foliar de 3-15 cm de comprimento e 1,5-5,5 cm de largura; com margem principalmente serrilhada. A floração ocorre duas vezes ao ano, sendo as flores alvas e odoríferas, apresentando ca. de 2,5-6 cm de diâmetro com 5 sépalas 5 e pétalas em número de 5 a numerosas. Dentre as espécies cultivadas foram encontradas *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, originária da Ásia, da qual se fabrica o chá preto, e *Camellia japonica* L., largamente utilizada em jardins residenciais, conhecida como camélia.

Agradecimentos
Ao CNPq através do Programa PIBIC-EM/UEPG pela bolsa concedida à primeira autora.